

TEST 1

1. Perché prima di eseguire una venipuntura si aspira il sangue?

- a. Per essere sicuri di avere inserito l'ago in vena
- b. Per ridurre il rischio di complicanze
- c. Per operare un lavaggio fisiologico della siringa
- d. Per ridurre le complicanze infettive

2. Quali sono i segni e sintomi di una crisi convulsiva generalizzata?

- a. Confusione mentale, contrazioni toniche, mandibola serrata, respiro polipnoico, incontinenza
- b. Perdita di coscienza, contrazioni tonico-cloniche, respiro superficiale, incontinenza urinaria, assenza di polso
- c. Perdita di coscienza, contrazioni tonico-cloniche, mandibola serrata, respiro rumoroso, incontinenza
- d. Perdita di coscienza, contrazioni tonico-cloniche, mandibola serrata, respiro rumoroso, incontinenza, assenza di polso

3. Il concetto di ambiente secondo le ipotesi teoriche di F. Nightingale è:

- a. Essenzialmente fisico
- b. Essenzialmente psico-sociale
- c. Inteso in senso globale
- d. Essenzialmente sociale

4. Quali dati dell'accertamento confermano meglio che l'infermiere dovrebbe iniziare la rianimazione cardiopolmonare in un paziente?

- a. Cute fredda, pallida; perdita di coscienza; assenza di polso radiale;
- b. Cianosi, polso lento, pupille dilatate;
- c. Polsi assenti, cute arrossata, pupille puntiformi;
- d. Apnea, assenza di polsi carotidei e femorali, pupille dilatate.

5. La linea guida è:

- a. Un insieme di principi generali che il vertice strategico di un'organizzazione emana per orientare l'attività dei propri dipendenti
- b. Un insieme di raccomandazioni, utili sia agli operatori sanitari, sia ai pazienti, circa il comportamento più appropriato in una determinata situazione clinica
- c. Uno schema di sequenze comportamentali orientate ad un obiettivo
- d. Nessuna delle risposte è corretta

6. Un paziente con demenza sta mostrando comportamenti aggressivi verso il personale. Qual è l'approccio più efficace per gestire questa situazione?

- a. Ignorare il comportamento e continuare con la cura
- b. Utilizzare la forza fisica per contenere il paziente
- c. Parlarci con calma e cercare di capire la causa del comportamento
- d. Allontanarsi e lasciare che il paziente si calmi da solo

7. Quali sono le cause della scarsa soddisfazione del sonno notturno in età senile?

- a. Aumento del numero e della durata dei risvegli
- b. Comparsa del fenomeno dei risvegli parziali brevi
- c. Tutte le risposte sono corrette
- d. Aumento del tempo di latenza dell'addormentamento

8. Quale delle seguenti è una complicanza comune dopo un intervento chirurgico?

- a. Ipertensione.
- b. Infezione.
- c. Aumento della frequenza cardiaca.
- d. Disidratazione.

9. Nei traumi chiusi addominali qual è l'organo più frequentemente interessato?

- a. il fegato
- b. lo stomaco
- c. la milza
- d. il pancreas

10. La regola del nove o regola di Wallace si usa per valutare:

- a. L'autonomia di un paziente semi-incosciente
- b. la quantità di liquidi da immettere nell'ustionato
- c. La percentuale di superficie corporea ustionata
- d. La capacità residua di un politraumatizzato

11. Qual è l'antidoto per benzodiazepine:

- a. Antistaminici
- b. Cortisone
- c. Flumazenil
- d. Fluimucil

12. Il ferro per via orale deve essere assunto:

- a. A stomaco pieno
- b. Secondo le preferenze del paziente
- c. Con molta acqua
- d. Nelle sole quantità naturalmente incluse negli alimenti

13. Scala di Barthel valuta:

- a. Rischio di dimissioni difficili
- b. Il grado di autonomia quotidiana
- c. Il rischio dell'insorgenza di LDP
- d. Rischio caduta

14. Se un paziente con terapia endovenosa in corso lamenta gonfiore, freddezza e lieve fastidio al sito di inserzione della fleboclisi, la complicanza più probabile è:

- a. L'infiltrazione
- b. La flebite
- c. L'infezione
- d. Il sovraccarico di liquidi

15. Dopo la valutazione della deglutizione con la logopedista, emerge che un residente ha un ritardo nell'innescare dell'atto deglutitorio e presenta una ridotta chiusura delle labbra. Oltre a proporre una dieta semisolida, quali altri consigli darà l'infermiere al familiare che sta aiutando nell'assunzione del pasto?

- a. Capo flesso in avanti, mantenere il tronco eretto e fermo, portare il mento verso lo sterno e compiere l'intero atto deglutitorio in questa posizione
- b. Temperatura del cibo; indispensabile che i cibi abbiano una temperatura vicina a quella corporea (36-37°C) per aumentare la velocità di deglutizione
- c. Rimuovere ogni residuo dalla bocca; far alzare la testa del residente verso l'alto per procedere alla rimozione con le dita
- d. Mettere in trendelenburg, rispettare i tempi deglutitori, piccoli bocconi

16. Con il termine "pollachiuria" si intende:

- a. La minzione difficoltosa e dolorosa
- b. La perdita involontaria di urina
- c. L'elevata frequenza delle minzioni
- d. Un'infezione delle vie urinarie

17. Quale fra questi NON è un fattore di rischio modificabile nell'ictus?

- a. Ipertensione arteriosa
- b. Diabete mellito
- c. Età
- d. Stenosi carotidea

18. La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:

- a. Dell'apparato osteo-articolare
- b. Tutte le risposte sono corrette
- c. Dell'apparato cardio-vascolare
- d. Della cute

19. Quale delle seguenti è una misura di prevenzione delle infezioni?

- a. Lavaggio delle mani
- b. Somministrazione di antibiotici
- c. Uso di antinfiammatori
- d. Monitoraggio della pressione

20. Quali sistemi di erogazione sono indicati per somministrare ossigeno ad alto flusso?

- a. Maschera di Venturi, maschera con reservoir
- b. Qualsiasi sistema, quello che conta sono i litri/minuto di ossigeno erogati
- c. Maschera semplice, maschera con reservoir
- d. Cannula nasale, maschera semplice

21. Quale dei seguenti è un effetto collaterale comune degli antibiotici?

- a. Ipertensione
- b. Diarrea
- c. Aumento di peso
- d. Sonno eccessivo

22. Durante la deambulazione assistita, il paziente deve:

- a. Guardare verso i piedi per controllarne la posizione
- b. Tenere gli occhi chiusi per evitare eventuali sensazioni di vertigine
- c. Mantenere la posizione eretta guardando avanti
- d. Nessuna delle risposte è corretta

23. Un paziente con una storia di alcolismo ha recentemente completato un programma di disintossicazione. Tuttavia, il personale ha notato cambiamenti nel comportamento, come irritabilità e ansia. L'infermiere sospetta che il paziente possa essere a rischio di una ricaduta. Qual è l'intervento più appropriato in questo caso?

- a. Ignorare il comportamento e osservare se si stabilizza
- b. Consultare un professionista della salute mentale per una valutazione
- c. Somministrare un ansiolitico per alleviare l'ansia
- d. Confrontare il paziente sul suo comportamento per spingerlo a cercare aiuto

24. Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:

- a. Ferita superficiale a spessore parziale che interessa l'epidermide
- b. Iperemia della cute intatta che scompare alla digitopressione
- c. Iperemia della cute intatta che non scompare alla digitopressione
- d. Ferita a spessore parziale che interessa l'epidermide e il derma

25. Qual è l'indicazione principale per l'uso di un catetere vescicale?

- a. Monitoraggio della temperatura corporea
- b. Rimozione delle feci
- c. Raccogliere campioni di urina e drenare la vescica

d. Somministrazione di farmaci per via endovenosa

26. Una “malattia infettiva che colpisca simultaneamente più collettività e la cui diffusione interessa più aree geografiche del mondo, con un alto numero di casi gravi ed una mortalità elevata” è detta:

- a. Nessuna delle seguenti opzioni è corretta
- b. Endemia
- c. Epidemia
- d. Pandemia

27. Qual è l’obiettivo principale della valutazione della cute in un paziente allettato?

- a. Verificare lo stato dell’igiene personale
- b. Prevenire le ulcere da decubito
- c. Monitorare i segni vitali
- d. Valutare l’idratazione del paziente

28. Il Clostridium difficile è responsabile dell'inflammazione:

- a. Della mucosa vaginale
- b. Della mucosa intestinale
- c. Del tessuto cardiaco
- d. Della mucosa orale

29. Quale dei seguenti interventi è più appropriato per il controllo del dolore in un paziente oncologico?

- a. Utilizzare solo rimedi naturali
- b. Somministrare analgesici secondo le necessità e il piano di trattamento
- c. Ignorare le lamentele di dolore del paziente
- d. Somministrare un analgesico solo se il dolore è insopportabile

30. Quale tra questi sono sintomi di disfagia:

- a. Perdita di peso repentina e salivazione eccessiva
- b. Frequenti polmoniti
- c. Voce gorgogliante e tosse o soffocamento dopo la deglutizione
- d. Tutti i precedenti

TEST 2

1. Si definisce sincope :

- a. una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza
- b. un sintomo dell'epilessia
- c. un sinonimo di ipotermia
- d. una perdita di coscienza irreversibile

2. Quale tipo di respirazione è caratterizzata da un respiro profondo e rapido?

- a. Bradipnea
- b. Tachipnea
- c. Cheyne-Stokes
- d. Kussmaul

3. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio il concetto di compliance nel contesto dell'assistenza infermieristica?

- a. La compliance si riferisce esclusivamente alla somministrazione corretta dei farmaci da parte dell'infermiere.
- b. La compliance indica il grado in cui un paziente segue le indicazioni terapeutiche e il piano di cura stabilito.
- c. La compliance riguarda solo l'adesione dei pazienti a programmi di riabilitazione fisica.
- d. La compliance è il processo attraverso il quale l'infermiere verifica la qualità delle attrezzature mediche utilizzate.

4. Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:

- a. Secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria
- b. Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
- c. Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
- d. Secchezza della cute, ipertensione, bradicardia e poliuria

5. Quale di questi non è un effetto degli analgesici oppiacei:

- a. Aumento dell'ampiezza e della frequenza del respiro
- b. Ipotensione
- c. Nausea e vomito
- d. Miosi

6. L'aprassia è:

- a. Un disturbo della memoria, associato a un disorientamento temporale dovuto a lesioni dell'emisfero dominante
- b. Un disturbo della comunicazione caratterizzato dall'incapacità di esprimere intenzionalmente il nucleo centrale dell'oggetto comunicativo
- c. Un disturbo della sensibilità che determina conseguentemente difficoltà motorie
- d. Un disturbo primitivo della funzione motoria consistente nell'incapacità di utilizzare il movimento per l'azione intenzionale

7. Nella relazione con un paziente schizofrenico in generale NON è opportuno:

- a. Tentare di dimostrare su basi razionali l'inesistenza del delirio
- b. Prestare attenzione ai sentimenti che stanno dietro al delirio
- c. Non pensare di dover sempre dire qualcosa e dare spazio all'ascolto attivo
- d. Essere autentici

8. Qual è l'importanza della scala di Glasgow nella valutazione del paziente?

- a. Valuta il dolore del paziente.
- b. Determina il rischio di cadute.
- c. Misura il livello di coscienza e la risposta neurologica.
- d. Valuta la funzionalità cardiaca.

9. Un paziente di 72 anni, con una storia di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), si presenta al pronto soccorso con dispnea progressiva, rialzo febbrile, cianosi e tosse produttiva di espettorato giallo-verde. Qual è la diagnosi più probabile per questo paziente?

- a. Asma bronchiale
- b. Polmonite
- c. Embolia polmonare
- d. Insufficienza cardiaca

10. Quale tra le seguenti non è una complicanza cronica del diabete:

- a. Retinopatia
- b. Nefropatia
- c. Chetoacidosi diabetica
- d. Sono tutte complicanze croniche del diabete

11. Che cosa si intende per antisepsi?

- a. Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili

- b. Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
- c. Un processo che permette l'uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi patogeni, saprofiti, miceti, spora e virus)
- d. La detersione eseguita mediante l'uso di saponi liquidi ad alto potere detergente

12. Dovendo compiere un esame colturale, non è necessario l'uso di contenitori sterili in caso di raccolta di:

- a. Feci
- b. Urine
- c. Sangue
- d. Escreato

13. Quale azione da parte dell'infermiere rappresenta una tecnica corretta di aspirazione nasofarigea/nasotracheale?

- a. Lubrificare il catetere di aspirazione con vaselina prima e tra inserzioni;
- b. Applicare l'aspirazione intermittente mentre si inserisce il catetere di aspirazione;
- c. Ruotare il catetere mentre si esegue l'aspirazione;
- d. Iperossigenare con ossigeno mentre si aspira

14. Quale affermazione relativa alla medicazione del CVC (catetere venoso centrale) è corretta:

- a. È necessario sostituire ogni 48 ore le medicazioni con garza e ogni 7 giorni quelle con film in poliuretano
- b. Bisogna detergere il sito di inserzione del catetere con movimenti circolari dal centro verso la periferia
- c. In caso di medicazione del sito è necessario fare indossare la mascherina anche al paziente
- d. Tutte le risposte sono corrette

15. Quali sono le principali funzioni dell'infermiere:

- a. Prevenzione delle malattie
- b. Assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età
- c. Educazione sanitaria
- d. Tutte le precedenti

16. Oltre il 90% delle fratture dell'anca nell'anziano è il risultato di:

- a. Una caduta
- b. Osteoporosi
- c. Traumi precedenti
- d. Indice di massa corporea basso (BMI < 18,5)

17. Qual è l'unità di misura della pressione arteriosa?

- a. mmHg
- b. L/min
- c. bpm
- d. mEq/L

18. Quando un individuo sviluppa una diminuzione della risposta all'azione di un farmaco si parla di:

- a. Tolleranza
- b. Effetto collaterale
- c. Reazione da ipersensibilità
- d. Tossicità

19. In caso di ustioni, quale è la prima cosa da fare?

- a. Applicare ghiaccio
- b. Rimuovere gli indumenti bruciati
- c. Raffreddare l'ustione con acqua corrente
- d. Applicare una pomata

20. Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale in un paziente adulto?

- a. 5ml
- b. 7 ml
- c. 10 ml
- d. 9 ml

21. Qual è il primo passo nella gestione di un'emorragia?

- a. Applicare un bendaggio
- b. Chiamare un medico
- c. Controllare i segni vitali
- d. Applicare pressione diretta sulla ferita

22. Se una persona giace supina con la testa più bassa dei piedi di circa 30 ° - 40 °, sta assumendo la posizione:

- a. Di Fowler
- b. Di Trendelenburg
- c. Di Semi- Fowler
- d. Di Anti- Trendelenburg

23. La terapia palliativa a come obiettivo:

- a. Il miglioramento della qualità di vita
- b. La guarigione clinica del paziente
- c. La possibilità di evitare una terapia chirurgica
- d. La riduzione delle dimensioni del tumore

24. Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, è da considerare NON CORRETTA?

- a. L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani
- b. Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani
- c. Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario
- d. Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso

25. Quale dei seguenti parametri è più indicativo di un'insufficienza respiratoria?

- a. Saturazione di ossigeno al 95%.
- b. Frequenza respiratoria di 12 atti/min.
- c. Saturazione di ossigeno al 88%.
- d. Frequenza cardiaca di 70 bpm.

26. Dopo aver inserito un catetere Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione?

- a. iniettare soluzione fisiologica
- b. far defluire l'urina
- c. gonfiare il palloncino
- d. tutte le precedenti

27. Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo all'uso degli antibiotici?

- a. Gli antibiotici possono essere assunti senza prescrizione.
- b. È importante completare l'intero ciclo di trattamento, anche se i sintomi migliorano.
- c. Gli antibiotici sono efficaci contro tutti i tipi di infezioni.
- d. Gli effetti collaterali degli antibiotici sono sempre gravi e immediati.

28. L'afasia espressiva è caratterizzata da:

- a. Incapacità totale sia nel linguaggio verbale sia in quello scritto
- b. Linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta
- c. Linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati
- d. Disturbo del linguaggio risultante da debolezza del controllo motorio, paralisi e movimenti scoordinati

29. La CPAP è comunemente usata per trattare quale condizione?

- a. Asma bronchiale.
- b. Apnee notturne.
- c. Bronchite acuta.
- d. Polmonite.

30. l'insulina è prodotta da:

- a. Fegato
- b. Reni
- c. Ipofisi
- d. Isole di langerhans

TEST 3

1. Gli effetti collaterali di un farmaco sono:

- a. Gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco nelle dosi terapeutiche
- b. Gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
- c. Gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
- d. Gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici

2. Secondo il D.lgs. n.81/08, cosa si intende per “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione rischi”

- a. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- b. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- c. Il dirigente
- d. Il medico competente

3. Quale dei seguenti fattori può influenzare negativamente la compliance del paziente al trattamento?

- a. Buona comunicazione tra il personale sanitario e il paziente
- b. Comprensione delle istruzioni terapeutiche da parte del paziente
- c. Comportamenti e credenze culturali del paziente riguardo alla malattia
- d. Supporto sociale da parte della famiglia e degli amici

4. Per debridement si intende:

- a. La rimozione di fibrina da una ferita
- b. La detersione e disinfezione di una ferita infetta
- c. La rimozione di tessuto devitalizzato da una ferita
- d. Solo la rimozione chirurgica dell'escara in una lesione da decubito

5. Quale tra le seguenti è una complicanza della ventilazione meccanica?

- a. Ipertensione
- b. Pneumotorace
- c. Ipercapnia
- d. Insufficienza renale

6. I neurolettici appartengono alla categoria di farmaci:

- a. Antipsicotici
- b. Ansiolitici
- c. Stabilizzatori dell'umore
- d. Tutte le risposte sono corrette

7. La sequenza corretta del processo di assistenza è:

- a. accertamento, valutazione, diagnosi infermieristica, pianificazione, attuazione
- b. accertamento, diagnosi infermieristica, pianificazione, attuazione, valutazione
- c. diagnosi infermieristica, accertamento, attuazione, pianificazione, valutazione
- d. accertamento, pianificazione, diagnosi infermieristica, attuazione, valutazione

8. "Metodo clinico utilizzato nell'assistenza infermieristica, che rappresenta l'applicazione del problem solving method ai problemi di salute di competenza infermieristica". La frase riportata è la definizione di:

- a. Linea guida infermieristica
- b. Protocollo infermieristico
- c. Processo di assistenza infermieristica
- d. Codice deontologico

9. Il registro di "scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope per la descrizione delle operazioni effettuate deve essere firmato:

- a. Dal coordinatore infermieristico dell'Unità Operativa
- b. Dai medici dell'Unità Operativa
- c. Dall'operatore che esegue la somministrazione
- d. Dal Direttore di farmacia

10. Uno degli effetti del ACE inibitori è:

- a. Ulcera gastrica
- b. Anemia
- c. Tosse secca
- d. Ipertensione

11. Un paziente di 55 anni con diagnosi di diabete mellito tipo 2 si presenta con ulcera diabetica al piede sinistro. L'infermiere nota segni di infezione locale e una storia di non compliance con il trattamento. Qual è l'intervento più importante che l'infermiere dovrebbe pianificare?

- a. Somministrare antibiotici per via endovenosa
- b. Educare il paziente sulla cura dei piedi e la gestione del diabete
- c. Rimproverare il paziente e mandarlo ad una visita specialistica dal medico chirurgo
- d. Monitorare i livelli di glucosio nel sangue ogni ora

12. Una sola delle seguenti affermazioni a proposito della vitamina D non è corretta. Quale?

- a. Al suo metabolismo collabora anche il fegato
- b. In caso di carenza aumenta la tendenza alle fratture spontanee delle ossa
- c. La sua principale funzione attiene alla coagulazione del sangue
- d. Ha la funzione di favorire l'assorbimento intestinale del calcio

13. Un uomo anziano è ricoverato in un reparto di medicina con una diagnosi di disidratazione. Quale segno o sintomo è più rappresentativo di un squilibrio del sodio?

- a. Iperreflessia
- b. Confusione mentale
- c. Polso irregolare
- d. Debolezza muscolare

14. In quale complicanza da immobilità può incorrere un paziente con prolungato decubito obbligato a letto?

- a. Alterazioni percettive
- b. Maggior suscettibilità alle infezioni
- c. Stasi delle secrezioni bronchiali
- d. Tutte le risposte sono corrette

15. Qual è l'antidoto da somministrare nel intossicazione da paracetamolo:

- a. Farmaci cortisonici
- b. N-acetilcisteina
- c. Antistaminici
- d. Diuretici

16. In caso di emergenza, qual è il primo passo da compiere?

- a. Chiamare un medico
- b. Valutare la scena
- c. Iniziare la rianimazione
- d. Contattare i familiari

17. Qual è la causa più comune della cianosi periferica?

- a. Riduzione della tensione di ossigeno nel sangue arterioso
- b. Compromissione generale della funzione respiratoria
- c. Vasocostrizione generalizzata per esposizione al freddo
- d. Vasodilatazione generalizzata per esposizione al caldo

18. Quale di queste è una complicanza comune della flebite?

- a. Ipotensione
- b. Insufficienza renale
- c. Emorragia
- d. Trombosi venosa profonda

19. Quale tra i seguenti requisiti riveste maggior importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere?

- a. Il ricambio della biancheria da letto
- b. La dotazione di disinfettanti e antibiotici
- c. Utilizzo dei guanti
- d. Il lavaggio delle mani

20. Un anziano di 80 anni residente in una casa di riposo presenta segni di confusione e disorientamento. Qual è la prima azione che l'infermiere dovrebbe intraprendere?

- a. Somministrare un sedativo
- b. Valutare i segni vitali e la storia medica
- c. Informare il medico di guardia
- d. Ignorare i sintomi e monitorare

21. L'aspirazione endotracheale di secrezioni va seguita:

- a. Al bisogno se preceduta da una iper ossigenazione del paziente della durata di 3-5 minuti
- b. Al bisogno e mantenendo la pressione negativa del catetere di aspirazione solo durante la sua introduzione nel tubo endotracheale
- c. Con frequenza almeno oraria
- d. Al bisogno

22. In caso di shock anafilattico, qual è l'intervento d'emergenza più appropriato da attuare?

- a. Somministrare un antistaminico per via orale
- b. Somministrare adrenalina per via intramuscolare
- c. Monitorare i segni vitali e aspettare che il paziente si stabilizzi
- d. Posizionare il paziente in posizione supina e fornire ossigeno.

23. L'igiene della colostomia deve essere effettuata:

- a. Con soluzione disinfettante saponosa
- b. Con soluzione disinfettante non a base alcolica
- c. Con acqua e sapone
- d. Tutte le risposte sono corrette

24. Qual è l'effetto principale della somministrazione di un anticoagulante?

- a. Aumenta la pressione sanguigna.
- b. Riduce il rischio di trombosi.
- c. Potenzia la coagulazione del sangue.
- d. Riduce il dolore.

25. La disuria è una minzione:

- a. Che avviene senza stimolo di urinare
- b. Notturna
- c. Dolorosa
- d. Difficoltosa

26. Quale dei seguenti segni può indicare una reazione allergica grave (anafilassi)?

- a. Febbre alta
- b. Edema facciale e difficoltà respiratorie
- c. Dolore addominale
- d. Stanchezza generale

27. Quale tra le seguenti alternative indica analgesici non oppioidi:

- a. Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Naprossene
- b. Acido acetilsalicilico, Tapentadolo, Ketoprofen
- c. Ibuprofene, Naprossene, Oxidone
- d. Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Fentanyl

28. Qual è la funzione principale della valvola unidirezionale in un sistema di aspirazione?

- a. Permettere il passaggio dell'aria in entrambe le direzioni.
- b. Impedire il reflusso del contenuto aspirato.
- c. Regolare la pressione dell'aria.
- d. Filtrare le impurità dall'aria aspirata.

29. I traumi cranici possono essere distinti in:

- a. aperti e chiusi
- b. primari e secondari
- c. aperti e secondari
- d. chiusi e primari

30. Quale dei seguenti interventi è più appropriato per il controllo del dolore in un paziente oncologico?

- a. Utilizzare solo rimedi naturali
- b. Somministrare analgesici secondo le necessità e il piano di trattamento
- c. Ignorare le lamentele di dolore del paziente
- d. Somministrare un analgesico solo se il dolore è insopportabile

Prova pratica 1

1. Ordinare con esattezza le operazioni da compiere per eseguire correttamente un prelievo venoso mediante vacutainer:

- a. Scrivere sulla provetta i dati del paziente
 - b. Scegliere una vena prominente
 - c. Invitare il paziente a scoprire le braccia
 - d. Applicare il laccio emostatico
 - e. Avvitare l'ago alla camicia
 - f. Porre la provetta sotto vuoto nella camicia
 - g. Tenendo ferma la camicia, spingere la provetta fino a forare il tappo in gomma
 - h. Rimuovere il laccio emostatico
 - i. Forare la cute e spingere l'ago in avanti
 - j. Disinfettare la zona
-

2. Ulcera da decubito

Fisiopatologia

Fattori di rischio

Prevenzione e gestione

3. Gestione cadute ospiti residenti in una struttura residenziale

Quali malattie mettono l'anziano a rischio cadute

Conseguenze

Prevenzione

Prova pratica 2

1. Ordinare con esattezza le operazioni da compiere per eseguire correttamente un prelievo di urine delle 24h

- a. Applicare al contenitore l'etichetta con il nome del paziente
 - b. Invitare il paziente ad urinare ed eliminare l'urina emessa
 - c. Disporre il cartello "diuresi" al letto del paziente
 - d. Iniziare la raccolta delle urine chiedendo al paziente, quando ne avvertisse lo stimolo, di raccogliere le urine nel recipiente predisposto
 - e. Preparare un contenitore graduato in plastica della capacità di 4 litri, un orinale e un cartello con l'indicazione "diuresi"
 - f. Illustrare la procedura al paziente
 - g. Inviare il contenitore in laboratorio
 - h. Rimuovere il cartello "diuresi"
 - i. Misurare la quantità di urine e annotarla
 - j. Il giorno successivo, alla stessa ora, invitare il paziente a mangiare e raccogliere le urine
-

2. Il bilancio idrico

Cos'è
Quando è necessario
Come si esegue

3. L'infezione correlata all'assistenza sanitaria

Cos'è
Fattori di rischio e trasmissione
Prevenzione

Prova pratica 3

1. Ordinare con esattezza le operazioni da compiere per eseguire correttamente una terapia trasfusionale
 - a. Inserire il puntale del deflussore nel dispositivo di accesso della sacca
 - b. Aprire lentamente il morsetto e far riempire il tubo
 - c. Procurarsi il prodotto da trasfondere secondo il protocollo dell'ospedale
 - d. Verificare che si tratti del prodotto giusto e controllare l'identità del paziente
 - e. Collegare il tubo riempito al catetere endovenoso
 - f. Lavarsi le mani e indossare i guanti
 - g. Schiacciare la camera di gocciolamento lasciando che si riempia di sangue
 - h. Capovolgere lentamente la sacca per 2-3 volte
 - i. Chiudere il morsetto a rullo
 - j. Aprire il set per la trasfusione
-

2. Nutrizione enterale

Definizione

Preparazione materiale/descrizione del set

Gestione paziente con SNG/PEG

3. Ossigenoterapia

Indicazioni in emergenza e fuori dall'emergenza

Effetti avversi

DOMANDE PROVA ORALE

Smaltimento rifiuti taglienti

Tipi stomie

Quali sono i DPI da utilizzare nell'assistenza al paziente con Clostridium Difficile

La calciparina per quale via viene somministrata

Quali sono i fattori che influenzano la guarigione delle lesioni

Acronimo LASA a cosa corrisponde

Legge 81/ 2008 a cosa si riferisce

La parola management significa

Alterazione dell'alvo

Tipologia LDP

Gestione della nutrizione enterale

Rilevazione della glicemia capillare

Gli stadi delle lesioni da pressione

Cos'è HACCP

La contenzione: rischi e assistenza alla persona

Paziente con stipsi: intervento

Il fecaloma: prevenzione e trattamento

Cos'è il WANDERING

Gestione assistenziale delle stomie per nutrizione enterale

Che cos'è e quando si utilizza l'indice BARTHEL

L'ipoglicemia nella persona diabetica: cause, segni, sintomi e gestione assistenziale

Corretta rilevazione dei parametri vitali

Vie somministrazione insulina rapida

Morbo di Alzheimer

Trattamento stipsi

Gestione dell'ematoma muscolare

I segni di un'infiammazione acuta

Cos'è la piuria

Somministrazione farmaci per via endovenosa

La prevenzione per la lesione di decubito sacrale

Le cause di cirrosi epatica

Warfarin: a cosa serve, alimenti da evitare

Sintomatologia dei disturbi urinari

Cos'è la disfagia

Qual è l'obiettivo della terapia palliativa

Gli ECM cosa sono

Procedura raccolta urine sterili

Valutazione della frequenza respiratoria

Cosa sono le benzodiazepine

Gestione SNG